

Лекция № 4

Дифференциальные уравнения высших порядков

Дифференциальное уравнение n -го порядка в общем случае имеет вид:

$$F(x, y, y', y'' \dots y^{(n)}) = 0$$

или

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'' \dots y^{(n-1)}) - \text{уравнение разрешенное относительно производной.}$$

Решение ДУ имеет вид $\Phi(x, y, C_1, C_2 \dots C_n) = 0$ и зависит от произвольных постоянных:

Определение 1. Задачей Коши для ДУ называется задача об отыскании частного решения ДУ, удовлетворяющего n начальным условиям, где n - порядок ДУ.

Определение 2. Начальные условия – это условия на функцию y и ее производные до $n-1$ порядка включительно, заданные в одной и той же точке x_0 , называемой начальной.

Поставить задачу Коши для ДУ это значит задать начальные условия.

Пример. Записать ДУ 4-го порядка в общем виде. Поставить задачу Коши.

$$y^{IV} = f(x, y, y', y'', y''')$$

$$y(x_0) = a$$

$$y'(x_0) = b$$

$$y''(x_0) = c$$

$$y'''(x_0) = d$$

Теорема существования и единственности решения ДУ высших порядков

$$\text{Дано: } y^{(n)} = f(x, y, y', y'' \dots y^{(n-1)})$$

Если в некоторой открытой области D функция $f(x, y, y', y'' \dots y^{(n-1)})$ и ее частные производные первого порядка по всем аргументам, начиная с y : $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}, \frac{\partial f}{\partial y''} \dots \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}$ определены и непрерывны и точка с

координатами $P_0 = (x_0, a, b, c, \dots, s)$, лежит внутри области, то при начальных условиях:

$$y(x_0) = a$$

$$y'(x_0) = b$$

$$y''(x_0) = c$$

.....

$$y^{(n-1)}(x_0) = s$$

.....

ДУ имеет, в достаточно малом интервале $[x_0 - h, x_0 + h]$, единственное решение, удовлетворяющее этим условиям.

Теорема утверждает два положения:

1. Решение существует на интервале, если функция $f(x, y, y', y'' \dots y^{(n-1)})$ непрерывна.
2. Решение единственное в области D , если имеются непрерывные частные производные $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}, \frac{\partial f}{\partial y''} \dots \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}$

Интегрирование ДУ высших порядков

Нахождение общего решения ДУ высшего порядка возможно только в нескольких случаях.

Случай 1. ДУ имеет вид: $y^{(n)} = f(x)$.

В этом случае решение находится в результате n кратного интегрирования левой и правой частей ДУ.

Пример 1. $y''' = \sin x$

$$\int y''' dx = \int \sin x dx \rightarrow y'' = -\cos x + C_1$$

$$\int y'' dx = \int (-\cos x + C_1) dx \rightarrow y' = -\sin x + C_1 x + C_2$$

$$\int y' dx = \int (-\sin x + C_1 x + C_2) dx \rightarrow y = \cos x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3$$

Случаи 2-4. ДУ допускает понижение порядка в результате специальных замен.

Случай 2.

ДУ имеет вид: $F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$ - ДУ не содержит y .

Замена: вводится новая функция: $z(x) = y^{(k)}$, тогда $y^{(k+1)} = z'$ и т.д.

Пример 2. $(x^2 + 1)y'' = 2x \cdot y'$ - ДУ 2-го порядка не содержит y .

Замена: $y' = z(x)$, тогда $y'' = z'$

Получим: $(x^2 + 1)z' = 2x \cdot z$ - ДУ 1-го порядка

Случай 3.

ДУ имеет вид: $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ - ДУ не содержит x .

Замена: вводится новая переменная: y

вводится новая функция: $p(y) = y'$, тогда

$$y'' = (y')' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp(y)}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p' \cdot y' = p' \cdot p$$

Пример 3. $(y')^2 + 2y \cdot y'' = 0$ - ДУ 2-го порядка не содержит x .

Замена: $y' = p(y)$, тогда $y'' = p' \cdot p$

Получим: $p^2 + 2y \cdot p' = 0$ - ДУ 1-го порядка

Случай 4.

ДУ является *однородным относительно y и производных*, а это значит оно не меняется в результате одновременной замены y на $k \cdot y$, y' на $k \cdot y'$ и т.д., где k – любое число, не равное 0.

Замена: вводится новая функция: $z(x) = \frac{y'}{y}$ или $y' = z \cdot y$, тогда

$$y'' = (z \cdot y)' = z' \cdot y + z \cdot y' = z' \cdot y + z \cdot (z \cdot y) = z' \cdot y + z^2 \cdot y$$

Пример 4. $x \cdot y \cdot y'' - x \cdot (y')^2 = y \cdot y'$ - ДУ 2-го порядка содержит x и y .

Проверяем на однородность: $x \cdot (ky) \cdot (ky'') - x \cdot (ky')^2 = ky \cdot ky'' - x \cdot (ky')^2$ - каждое слагаемое в ДУ содержит k^2 , сократив на которое ($k \neq 0$), получим исходное ДУ.

Замена: $y' = z(x) \cdot y$, тогда $y'' = z' \cdot y + z^2 \cdot y$

Получим: $x \cdot y \cdot (z' \cdot y + z^2 \cdot y) - x \cdot (z \cdot y)^2 = y \cdot z \cdot y$

$$x \cdot z' \cdot y^2 + x \cdot z^2 \cdot y^2 - x \cdot z^2 \cdot y^2 = y^2 \cdot z$$

$$x \cdot z' + x \cdot z^2 - x \cdot z^2 = z$$

$$x \cdot z' = z - \text{ДУ 1-го порядка}$$

Общий алгоритм решения ДУ высшего порядка, допускающего понижение порядка

1. Понизить порядок ДУ до 1-го, используя необходимые замены.
2. Решить ДУ 1-го порядка.
3. Сделать обратные замены. Если необходимо опять понизить порядок (п.1-2). Всего нужно решить n ДУ 1-го порядка.
4. Выписать все решения ДУ. Хотя бы одно из них должно содержать n произвольных постоянных.
5. Проверить потерянные решения.
6. Записать ответ.

Примеры: Решить ДУ высших порядков

№2 Дано: $(x^2 + 1)y'' = 2x \cdot y'$

Решение: $y = C_1 \frac{x^3}{3} + C_2 x + C_3$

№3 Дано: $(y')^2 + 2y \cdot y'' = 0$

Решение: $\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} = C_1 x + C_2, \quad y = C$

№4 Дано: $x \cdot y \cdot y'' - x \cdot (y')^2 = y \cdot y'$

Решение: $\ln y = C_1 \frac{x^2}{2} + C_2, \quad y = C$

Алгоритм решения задачи Коши для ДУ n-го порядка

1. Решить ДУ. Записать его общее решение.
2. Продифференцировать общее решение n раз.
3. Объединить общее решение и все производные.
4. Подставить в полученные выражения начальные условия. Получится система алгебраических уравнений, относительно произвольных постоянных $C_1, C_2 \dots C_n$.
5. Решить систему. Найти $C_1, C_2 \dots C_n$.
6. Подставить найденные значения в общее решение – это решение задачи Коши.

Примеры: Решить задачу Коши для ДУ 2-го порядка

№5 Дано: $(x^2 + 1)y'' = 2x \cdot y'$

$$y(1) = 1$$

$$y'(1) = 2$$

Решение: $y = \frac{x^3}{3} + x - \frac{1}{3}$