

Образец выполнения этапа #3

*Расчетно-графическая работа по курсу Дифференциальные уравнения
Выполнил студент группы 17-201
Иванов И.И.
Вариант №1*

Этап #3

Задание:

<p>Вариант №1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $y'' + 4y = \cos(2x) + 4x^2 - 3x \cdot \sin(2x)$ 2. $y'' + 4y = 4x^2 - x$ 3. $y'' + 4y = \frac{1}{\cos(2x)}$ 	<p>Этап #3</p> <p><u>Задание.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить структуру общего решения ЛНДУ методом подбора частного решения (коэффициенты частного решения не определять). 2. Решить ЛНДУ методом подбора частного решения. 3. Решить ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных.
---	---

Часть 1.

Дано: $y'' + 4y = \cos(2x) + 4x^2 - 3x \cdot \sin(2x)$

Определить структуру общего решения ЛНДУ методом подбора частного решения.

Решение:

Решаем соответствующее ЛОДУ с той же левой частью:

$$y'' + 4y = 0$$

$$\lambda^2 + 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 2i$$

$$y_{\text{одн}} = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$$

Исследуем структуру правой части ЛНДУ:

1 слагаемое:	$\cos(2x)$	$\alpha = 0 \quad \beta = 2 \quad m = 0$
2 слагаемое:	$4x^2$	$\alpha = 0 \quad \beta = 0 \quad m = 2$
3 слагаемое:	$-3x \cdot \sin(2x)$	$\alpha = 0 \quad \beta = 2 \quad m = 1$

Группируем слагаемые с одинаковыми параметрами α и β :

1 и 3 слагаемое:	$\cos(2x)$ $-3x \cdot \sin(2x)$	$\alpha = 0 \quad \beta = 2 \quad m = 1$	1 группа
2 слагаемое:	$4x^2$	$\alpha = 0 \quad \beta = 0 \quad m = 2$	2 группа

Образец выполнения этапа #3

Для каждой группы слагаемых записываем частное решение:

Первое частное решение: $\alpha = 0 \quad \beta = 2 \quad m = 1$

$$y_{\text{част1}} = x^S \cdot [(b_0 + b_1x) \cdot \cos(2x) + (b_2 + b_3x) \cdot \sin(2x)] \cdot e^{0 \cdot x}$$
$$\alpha + i\beta = 0 + i \cdot 2 = 2i \rightarrow S = 1$$

Окончательно: $y_{\text{част1}} = x \cdot [(b_0 + b_1x) \cdot \cos(2x) + (b_2 + b_3x) \cdot \sin(2x)]$

Второе частное решение: $\alpha = 0 \quad \beta = 0 \quad m = 2$

$$y_{\text{част2}} = x^S \cdot (b_4 + b_5x + b_6x^2) \cdot e^{0 \cdot x}$$
$$\alpha + i\beta = 0 + i \cdot 0 = 0 \rightarrow S = 0$$

Окончательно: $y_{\text{част2}} = b_4 + b_5x + b_6x^2$

Записываем структуру общего решения ЛНДУ:

$$y = y_{\text{одн}} + y_{\text{част1}} + y_{\text{част2}}$$

Ответ:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + x \cdot [(b_0 + b_1x) \cdot \cos(2x) + (b_2 + b_3x) \cdot \sin(2x)] + b_4 + b_5x + b_6x^2$$

Часть 2.

Дано: $y'' + 4y = 4x^2 - x$

Решить ЛНДУ методом подбора частного решения.

Решение:

Решаем соответствующее ЛОДУ с той же левой частью:

$$y'' + 4y = 0$$

$$\lambda^2 + 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 2i$$

$$y_{\text{одн}} = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$$

Исследуем структуру правой части ЛНДУ:

1 слагаемое:	$4x^2$	$\alpha = 0$	$\beta = 0$	$m = 2$
2 слагаемое:	$-x$	$\alpha = 0$	$\beta = 0$	$m = 1$

Группируем слагаемые с одинаковыми параметрами α и β :

1 и 2 слагаемое:	$4x^2$ $-x$	$\alpha = 0$	$\beta = 0$	$m = 2$	1 группа
------------------	----------------	--------------	-------------	---------	----------

Образец выполнения этапа #3

Для полученной группы слагаемых записываем частное решение:

Частное решение: $\alpha = 0 \quad \beta = 0 \quad m = 2$

$$y_{\text{част}} = x^S \cdot (b_0 + b_1x + b_2x^2) \cdot e^{0 \cdot x}$$
$$\alpha + i\beta = 0 + i \cdot 0 = 0 \rightarrow S = 0$$

Окончательно: $y_{\text{част}} = b_0 + b_1x + b_2x^2$

Находим неизвестные коэффициенты частного решения методом неопределенных коэффициентов:

$$y_{\text{част}} = b_0 + b_1x + b_2x^2$$

$$y'_{\text{част}} = b_1 + 2 \cdot b_2x$$

$$y''_{\text{част}} = 2 \cdot b_2$$

$$y''_{\text{част}} + 4y_{\text{част}} = 4x^2 - x$$

$$2 \cdot b_2 + 4 \cdot (b_0 + b_1x + b_2x^2) = 4x^2 - x$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях уравнения:

x^0	$2 \cdot b_2 + 4 \cdot b_0 = 0$
x	$4 \cdot b_1 = -1$
x^2	$4 \cdot b_2 = 4$

Из полученной системы находим:

$$b_0 = -\frac{1}{2}$$

$$b_1 = -\frac{1}{4}$$

$$b_2 = 1$$

Окончательно: $y_{\text{част}} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + x^2$

Проверка:

$$y_{\text{част}} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + x^2$$

$$y'_{\text{част}} = -\frac{1}{4} + 2 \cdot x$$

$$y''_{\text{част}} = 2$$

$$y''_{\text{част}} + 4y_{\text{част}} = 4x^2 - x$$

$$2 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + x^2\right) = 4x^2 - x$$

$$2 - 2 - x + 4x^2 = 4x^2 - x$$

$$\underline{4x^2 - x \equiv 4x^2 - x}$$

Записываем решение ЛНДУ:

$$y = y_{\text{одн}} + y_{\text{част1}}$$

Ответ:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + x^2$$

Часть 3.

Дано: $y'' + 4y = \frac{1}{\cos(2x)}$

Решить ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных.

Решение:

Решаем соответствующее ЛОДУ с той же левой частью:

$$y'' + 4y = 0$$

$$\lambda^2 + 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 2i$$

$$y_{\text{одн}} = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$$

В полученном решении заменяем произвольные постоянные на неизвестные функции.

$$y = C_1(x) \cos(2x) + C_2(x) \sin(2x)$$

Составляем систему алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos(2x) + C_2'(x) \sin(2x) = 0 \\ -2 \cdot C_1'(x) \sin(2x) + 2 \cdot C_2'(x) \cos(2x) = \frac{1}{\cos(2x)} \end{cases}$$

Решаем полученную систему:

$$C_2' = \frac{1}{2}$$

$$C_1'(x) = -\frac{1}{2} \cdot \operatorname{tg}(2x)$$

Находим неизвестные функции:

$$C_2' = \int \frac{1}{2} dx = \frac{x}{2} + \hat{C}_2$$

$$C_1'(x) = \int -\frac{1}{2} \operatorname{tg}(2x) dx = \frac{1}{4} \ln|\cos(2x)| + \hat{C}_1$$

Образец выполнения этапа #3

Подставляем найденные выражения в решение:

$$\begin{aligned}y &= \left(\frac{1}{4} \ln|\cos(2x)| + C_1 \right) \cdot \cos(2x) + \left(\frac{x}{2} + C_2 \right) \cdot \sin(2x) = \\ &= C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + \frac{1}{4} \ln|\cos(2x)| \cdot \cos(2x) + \frac{x}{2} \cdot \sin(2x)\end{aligned}$$

Ответ:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + \frac{1}{4} \ln|\cos(2x)| \cdot \cos(2x) + \frac{x}{2} \cdot \sin(2x)$$