

## Лекция № 10

### Интерполяция и аппроксимация функций

Интерполяция - изменение (лат.)

Аппроксимация - приближение (лат.)

### Интерполирование функций


Будем считать данную функцию  $f(x)$  и некоторую функцию  $F(x)$  близкими, если они совпадают на заданной системе точек  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$ . Эти точки называют узлами интерполяции.

### Постановка задачи интерполирования

На отрезке  $[a, b]$  заданы  $n + 1$  точка  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$  и значение некоторой функции  $f(x)$  в этих точках:  $f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1 \dots f(x_n) = y_n$ ,

Требуется построить функцию  $F(x)$ , принадлежащую определенному классу и принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и  $f(x)$ , т.е.

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1 \dots F(x_n) = y_n,$$



Геометрически это означает, что требуется найти кривую  $y = F(x)$  некоторого определенного типа, проходящую через систему точек  $M_i = (x_i, y_i)$ .

В такой постановке задача имеет бесконечное множество решений. Но задача становится однозначной, если вместо любой функции  $F(x)$  искать полином  $Q_m(x)$ , где

$$Q_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$$

### Интерполяционный полином Лагранжа

Как известно, существует единственный полином степени не выше  $n$ , принимающий в точках  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$  заданные значения, поэтому можно положить  $m = n$  и  $Q_m(x) = Q_n(x)$ .

Коэффициенты  $a_i$  полинома  $Q_n(x)$  можно определить из системы уравнений:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_2^n = y_2 \\ \dots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$

Определитель такой системы есть так называемый определитель Вандермонда :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq p < q \leq n} (x_q - x_p) \neq 0$$

и следовательно система имеет единственное решение.

Полином  $L_n(x)$ , коэффициенты которого определяются из системы, называют **интерполяционным полиномом Лагранжа** для функции  $f(x)$ , и может быть записан в явном виде :

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} y_i$$

Эта интерполяционная формула справедлива в случае произвольно заданных узлов интерполяции.

**Остаточный член** интерполяционного полинома Лагранжа (погрешность вычисления приближенного значения функции в точке  $x$ ) имеет вид :

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n), \quad \text{где } \xi - \text{внутренняя точка}$$

минимального отрезка, содержащего  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$  и точку  $x$ .

### Пример 1.

Дано: функция, заданная таблично:

x	1	2	3	4
f(x)	5	8	10	5

Полином Лагранжа :

$$\begin{aligned} L(x) &= \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)} \cdot 5 + \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)} \cdot 8 + \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)} \cdot 10 + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)} \cdot 5 \\ &= -x^3 + 5.5x^2 - 6.5x + 7 \end{aligned}$$

**Замечание.** В случае интерполирования полиномами, все интерполяционные формулы получаются из формулы Лагранжа при соответствующем выборе узлов.

В случае равноотстоящих узлов интерполяции используют интерполяционные формулы Ньютона.

### 1-я интерполяционная формула Ньютона

Пусть для функции  $y = f(x)$  заданы значения  $y_i = f(x_i)$  для равноотстоящих значений независимой переменной :

$$x_i = x_0 + i \cdot h, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad \text{где } h - \text{ шаг интерполяции (расстояние между узлами)}$$

Тогда интерполяционный полином Ньютона (1-я формула) будет иметь вид :

$$P_n(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1) + \frac{\Delta^3 y_0}{3!h^3}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})$$

здесь  $\Delta^j y_i$  - конечная разность порядка  $j$ .

Полагая  $\frac{x - x_0}{h} = q$ , можно интерполяционный полином Ньютона записать в следующем виде :

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)\Delta^2 y_0}{2!} + \frac{q(q-1)(q-2)\Delta^3 y_0}{3!} + \dots + \frac{q(q-1)(q-2)\dots(q-n+1)\Delta^n y_0}{n!}$$

Конечные разности (формулы для вычисления)

$$\Delta y_i = \Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i) = y_{i+1} - y_i$$

$$\Delta^2 y_i = \Delta^2 f(x_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$$

$$\Delta^3 y_i = \Delta^3 f(x_i) = \Delta^2 y_{i+1} - \Delta^2 y_i$$

.....

$$\Delta^n y_i = \Delta^n f(x_i) = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$$

Для вычисления конечных разностей удобно использовать таблицы. Приведем пример на случай 4 узлов интерполяции :

x	y	$\Delta y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
$x_0$	$y_0$	$\Delta y_0$	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$
$x_1$	$y_1$	$\Delta y_1$	$\Delta^2 y_1$	
$x_2$	$y_2$	$\Delta y_2$		
$x_3$	$y_3$			

В 1-й интерполяционной формуле Ньютона используется первая строка таблицы конечных разностей.

Остаточный член интерполяционного полинома Ньютона :

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q-1)(q-2)\dots(q-n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

Причем, если  $f(x)$  задана таблично, то  $f^{(n+1)}(\xi) = \frac{\Delta^{n+1} y_0}{h^{n+1}}$ .

**Пример 2.**

Функция задана таблично :

x	1	2	3	4
f(x)	5	8	10	5

1-я формула Ньютона:

Таблица конечных разностей :

x	y	$\Delta y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1	5	3	-1	-6
2	8	2	-7	
3	10	-5		
4	5			

$$h = 2 - 1 = 1$$

$$P(x) = 5 + \frac{3}{1}(x-1) + \frac{-1}{2}(x-1)(x-2) + \frac{-6}{6}(x-1)(x-2)(x-3) = -x^3 + 5.5x^2 - 6.5x + 7$$

**Замечание.** В случае равноотстоящих узлов полином Лагранжа переходит в полином Ньютона.

### Использование интерполяционных формул

Интерполяционные формулы используют для приближенного вычисления значений функции  $f(x)$  для  $x$  отличных от узлов интерполяции.

Различают :

- а) интерполирование, когда  $x \in [x_0, x_n]$
- б) экстраполирование, когда  $x \notin [x_0, x_n]$

### Аппроксимация

На практике часто бывает, что заданный порядок  $m$  приближающего полинома  $Q_m(x)$  значительно меньше числа узлов  $n+1$ . В этом случае интерполирование, вообще говоря, становится невозможным и приходится прибегать к иным приемам построения приближающих полиномов. Обычно здесь используют точечный метод наименьших квадратов. Согласно этому способу за меру отклонения полинома

$$Q_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$$

от данной функции  $f(x)$  на множестве точек  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$  принимают величину :

$$S_m = \sum_{i=0}^n [Q_m(x_i) - y_i]^2, \text{ где } y_i = f(x_i)$$

равную сумме квадратов отклонений полинома  $Q_m(x)$  от функции  $f(x)$  на заданной системе точек.

$S_m$  - это функция коэффициентов  $a_0, a_1, a_2 \dots a_m$ , эти коэффициенты надо подобрать так, чтобы величина  $S_m$  была наименьшей. Полученный полином называют **аппроксимирующим** для данной функции, а процесс построения этого полинома - **точечной квадратичной аппроксимацией функции**.

Для решения задачи точечной квадратичной аппроксимации найдем частные производные от величины:

$$S_m = \sum_{i=0}^n [a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + \dots + a_m x_i^m - y_i]^2$$

по всем переменным  $a_0, a_1, a_2 \dots a_m$ .

Приравнявая эти производные нулю, получим для определения неизвестных  $a_0, a_1, a_2 \dots a_m$  систему  $m + 1$  уравнений с  $m + 1$  неизвестными.

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{\partial S_m}{\partial a_0} = \sum_{i=0}^n (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + \dots + a_m x_i^m - y_i) = 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial S_m}{\partial a_m} = \sum_{i=0}^n (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + \dots + a_m x_i^m - y_i) x_i^m = 0 \\ \dots \\ \frac{1}{2} \frac{\partial S_m}{\partial a_m} = \sum_{i=0}^n (a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + \dots + a_m x_i^m - y_i) x_i^m = 0 \end{cases}$$

Введем обозначения :

$$s_k = x_0^k + x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$t_k = x_0^k y_0 + x_1^k y_1 + x_2^k y_2 + \dots + x_n^k y_n, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Обычно для удобства необходимые величины вычисляют по таблице :

$x^0$	$x$	$x^2$	$x^3$	...	$x^{2m}$	$y$	$xy$	$xy^2$	...	$x^m y$
1	$x_0$	$x_0^2$	$x_0^3$	...	$x_0^{2m}$	$y_0$	$x_0 y_0$	$x_0^2 y_0$	...	$x_0^m y_0$
1	$x_1$	$x_1^2$	$x_1^3$	...	$x_1^{2m}$	$y_1$	$x_1 y_1$	$x_1^2 y_1$	...	$x_1^m y_1$
1	$x_2$	$x_2^2$	$x_2^3$	...	$x_2^{2m}$	$y_2$	$x_2 y_2$	$x_2^2 y_2$	...	$x_2^m y_2$
				...					...	
1	$x_n$	$x_n^2$	$x_n^3$	...	$x_n^{2m}$	$y_n$	$x_n y_n$	$x_n^2 y_n$	...	$x_n^m y_n$
$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	...	$s_{2m}$	$t_0$	$t_1$	$t_2$	...	$t_m$

Тогда, используя введенные обозначения, будем иметь систему :

$$\begin{cases} a_0 s_0 + a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_m s_m = t_0 \\ a_0 s_1 + a_1 s_2 + a_2 s_3 + \dots + a_m s_{m+1} = t_1 \\ a_0 s_2 + a_1 s_3 + a_2 s_4 + \dots + a_m s_{m+2} = t_2 \\ \dots \\ a_0 s_m + a_1 s_{m+1} + a_2 s_{m+2} + \dots + a_m s_{2m} = t_m \end{cases}$$

Можно доказать, что если среди точек  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$  нет совпадающих и  $m \leq n$ , то определитель системы отличен от нуля, и, следовательно эта система имеет единственное решение.

Полином с коэффициентами  $a_0, a_1, a_2 \dots a_m$ , полученными как решение системы, обладает минимальным квадратичным отклонением.

Замечание. Если  $m = n$ , то аппроксимирующий полином  $Q_m(x)$  совпадает с полиномом Лагранжа для системы точек  $x_0, x_1, x_2 \dots x_n$ .

**Пример 3.**

Функция задана таблично :

x	1	2	3	4
f(x)	5	8	10	5

Аппроксимирующий полином 2-го порядка

Будем искать полином  $Q_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

Коэффициенты системы для определения  $a_0, a_1, a_2$

$x^0$	x	$x^2$	$x^3$	$x^4$	y	xy	$xy^2$
1	1	1	1	1	5	5	5
1	2	4	8	16	8	16	32
1	3	9	27	81	10	30	90
1	4	16	64	256	5	20	80
$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_4$	$t_0$	$t_1$	$t_2$
4	10	30	100	354	28	71	207

Тогда :

$$\begin{cases} 4a_0 + 10a_1 + 30a_2 = 28 \\ 10a_0 + 30a_1 + 100a_2 = 71 \\ 30a_0 + 100a_1 + 354a_2 = 207 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a_0 = -3.5 \\ a_1 = 10.2 \\ a_2 = -2 \end{matrix} \Rightarrow Q_2(x) = -3.5 + 10.2x - 2x^2$$