

Лекция № 3

Прямые методы поиска безусловного экстремума ФМП

Решение задачи о поиске безусловного экстремума $f(X)$ с помощью необходимых и достаточных условий, приводит к необходимости решать систему n нелинейных уравнений с n неизвестными, с последующей проверкой знакоопределенности $H(X^*)$. Как правило, для достаточно сложных функций такая процедура решения задачи достаточно трудоемка и подразумевает численное решение нескольких задач. Поэтому возникает необходимость использовать так называемые прямые или численные методы безусловной оптимизации, которые позволяют найти стационарные точки функции, не используя аппарат необходимых и достаточных условий экстремума.

Замечание. Во всех прямых методах рассматривается задача о поиске минимума функции $f(X)$, задача поиска максимума функции $f(X)$ может быть решена заменой целевой функции на $-f(X)$.

Все прямые методы ищут точки как предел последовательности точек $\{X^k\}$ при $k \rightarrow \infty$.

Определение 1. Последовательность $\{X^k\}$ называется минимизирующей, если $\lim_{k \rightarrow \infty} f(X^k) = f(X^*)$,

т.е. последовательность сходится к нижней грани функции $f(X)$.

Не всякая минимизирующая последовательность дает возможность найти искомую точку минимума.

Определение 2. Последовательность $\{X^k\}$ называется сходящейся к точке минимума, если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X^k = X^*.$$

Все прямые методы имеют один и тот же алгоритм: $X^{k+1} = X^k + t_k d^k$, где

- X^k - текущая точка последовательности, причем X^0 - задается из физического содержания задачи или произвольно;
- X^{k+1} - последующая точка последовательности;
- d^k - приемлемое направление перехода из точки в точку – направление спуска. Приемлемым при решении задачи поиска минимума функции будет только то направление, для которого $f(X^{k+1}) < f(X^k)$, что обеспечивается выполнением условия $(\nabla f(X^k), d^k) < 0$;
- t_k - шаг (число > 0).

Процесс преобразования точки X^k в точку X^{k+1} называют итерацией, а сам процесс построения последовательности точек по определенному правилу, оканчивающийся согласно выполнению критерия окончания – итерационным.

Все прямые методы отличаются друг от друга способом задания d^k и выбором t_k .

В зависимости от наивысшего порядка частных производных функции $f(X)$, используемых для формирования направления d^k , численные методы решения задачи безусловной минимизации принято делить на три группы:

1. Методы первого порядка, использующие информацию о 1-х производных функции $f(X)$.
2. Методы второго порядка, использующие для своей реализации информацию о 1-х и 2-х производных функции $f(X)$.
3. Методы нулевого порядка, использующие информацию только о значении функции $f(X)$.

Методы первого порядка


(1) Метод градиентного спуска

Алгоритм метода: $X^{k+1} = X^k - t_k \nabla f(X^k)$ (1.1)

здесь:

- $d^k = -\nabla f(X^k)$ - направление антиградиента функции;
- t_k - шаг выбирается из условия убывания функции в точках последовательности:
 $f(X^{k+1}) < f(X^k)$. (1.2)

Геометрическая интерпретация метода:



Основной критерий окончания метода:

Построение последовательности заканчивается в точке, для которой:

$$\|\nabla f(X^k)\| < \varepsilon, \text{ где } \varepsilon - \text{ заданное малое положительное число.} \quad (1.3)$$

Дополнительные критерии окончания метода:

- при выполнении предельного числа итераций: $k = M$ (1.4)
- при однократном или двукратном одновременном выполнении двух условий:


$$\|X^{k+1} - X^k\| < \tilde{\varepsilon}, \quad |f(X^{k+1}) - f(X^k)| < \tilde{\varepsilon}, \text{ где } \tilde{\varepsilon} - \text{ малое положительное число.} \quad (1.5)$$

(2) Метод градиентного наискорейшего спуска

Алгоритм метода: $X^{k+1} = X^k - t_k \nabla f(X^k)$ (2.1)

здесь

- $d^k = -\nabla f(X^k)$ - направление антиградиента функции
- t_k - шаг вычисляется из условия наибольшего убывания функции в точках последовательности, построенной по закону (2.1): $t_k = \arg \min[f(X^{k+1})]$ (2.2)

Геометрическая интерпретация метода

Как видно из чертежа, точка X^1 принимает на направлении спуска $d^0 = -\nabla f(X^0)$ предельное положение, которое характеризуется тем, что линия уровня, проходящая через точку X^1 касается направления спуска, а, следовательно, в точках минимизирующей последовательности, построенной по методу градиентного наискорейшего спуска выполняется условие:

$$\nabla f(X^k) \perp \nabla f(X^{k+1}) \Rightarrow (\nabla f(X^k), \nabla f(X^{k+1})) = 0 \quad (2.3)$$

Критерии окончания метода такие же, как и в методе градиентного спуска.

Вычисление шага t_k может быть выполнено тремя способами:

Способ А заключается в вычислении функции $f(X^{k+1})$, эта функция оказывается функцией одной переменной t_k , т.е. $f(X^{k+1}) = \varphi(t_k)$, и последующем использовании необходимых и достаточных условий безусловного экстремума этой функции: $\frac{d\varphi(t_k)}{dt_k} = 0$; $\frac{d^2\varphi(t_k)}{d^2t_k} > 0$. Этот способ может быть использован в случаях, когда функция $f(X)$ достаточно проста.

Способ В заключается в использовании условия (2.3) для вычисления шага. Способ также может быть использован в случаях, когда функция $f(X)$ достаточно проста.

Способ С предполагает численное решение задачи $f(X^{k+1}) = \varphi(t_k) \rightarrow \min$ методом дихотомии (см. [2], глава II, §5, п. 5.1.4.) на отрезке $[a, b]$ с заданной точностью ε_D .


(3) Метод покоординатного спуска

Алгоритм метода:
$$X^{k+1} = X^k - t_k \left[\nabla f(X^k) \right]_{\text{пр на } x_i} \quad (3.1)$$

здесь:

- $d^k = -\left[\nabla f(X^k) \right]_{\text{пр на } x_i}$ - проекция на ось x_i антиградиента функции
- t_k - шаг выбирается из условия убывания функции в точках последовательности:

$$f(X^{k+1}) < f(X^k) \quad (3.2)$$

Геометрическая интерпретация метода


Критерии окончания метода такие же, как и в методе градиентного спуска.

(4) Метод Гаусса-Зейделя (наискорейшего по координатного спуска)

Алгоритм метода: $X^{k+1} = X^k - t_k [\nabla f(X^k)]_{\text{пр на } x_i}$ (4.1)

здесь:

- $d^k = -[\nabla f(X^k)]_{\text{пр на } x_i}$ - проекция на ось x_i антиградиента функции
- t_k - шаг вычисляется из условия наибольшего убывания функции в точках последовательности, построенной по закону (4.1): $t_k = \arg \min[f(X^{k+1})]$ (4.2)

Геометрическая интерпретация метода

Критерии окончания метода такие же, как и в методе градиентного спуска.

Вычисление шага t_k может быть выполнено способами А и С, описанными в методе градиентного наискорейшего спуска.

Сходимость метода градиентного спуска (градиентного наискорейшего спуска, покоординатного спуска и метода Гаусса-Зейделя) регламентируется теоремой.

Теорема.

Если функция $f(X)$ ограничена снизу, а ее градиент удовлетворяет условию Липшица:

$$\|\nabla f(X) - \nabla f(Y)\| \leq L\|X - Y\|, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n, \quad L > 0,$$

то метод градиентного спуска гарантирует $\|\nabla f(X^k)\| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Поскольку критерий окончания гарантирует выполнение в точке $X^* = \lim_{k \rightarrow \infty} X^k$ только необходимых условий минимума, но не достаточных, можно утверждать, что метод обеспечивает сходимость к стационарной точке функции, в которой необходимо проверить достаточные условия минимума.

Сходимость именно к точке минимума гарантируется только для выпуклых функций.

(5) Метод сопряженных градиентов (Флетчера-Ривса)

Алгоритм метода: $X^{k+1} = X^k + t_k d^k$ (5.1)

здесь:

$$d^0 = -\nabla f(X^0) \quad (5.2)$$


$$d^k = -\nabla f(X^k) + \beta_{k-1} d^{k-1} \quad (5.3)$$

$$\beta_{k-1} = \frac{\|\nabla f(X^k)\|^2}{\|\nabla f(X^{k-1})\|^2} \quad (5.4)$$

$$t_k - \text{ шаг вычисляется из условия наибольшего убывания функции в точках последовательности, построенной по закону (5.1): } t_k = \arg \min[f(X^{k+1})] \quad (5.5)$$

Из формул (5.2) и (5.5) следует, что первая итерация метода сопряженных градиентов совпадает с первой итерацией метода наискорейшего спуска.

Геометрическая интерпретация метода



Критерии окончания метода такие же, как и в методе градиентного спуска.

Вычисление шага t_k может быть выполнено способами А и С, описанными в методе градиентного наискорейшего спуска.

Для квадратичных функций метод сопряженных градиентов называется методом Флетчера-Ривса.

Доказано, что для функций, имеющих минимум, метод Флетчера-Ривса сходится за конечное число шагов, не превышающее число переменных функции $f(\bar{X})$.

Для не квадратичных функций, используется модификация метода сопряженных градиентов, называемая методом Полака-Рибьера (см.[2], гл.II, §6. п.6.5).